

Domenica 19 aprile 1993

IL CHIRURGO PLASTICO



Egregio Dott. Amata, ho sentito parlare da più parti e su varie riviste di un intervento di chirurgia plastica che aumenta il volume delle labbra senza necessità di riempirle col silicone oppure con altre sostanze che vengono poi riassorbite e vengono pertanto periodicamente iniettate.

Cosa ne pensa? Quali sono i risultati che si ottengono?

Le metodiche di aumento del volume delle labbra sono varie e possono essere eseguite in via ambulatoriale. Le plastiche di scorrimento provocano una rotazione verso l'esterno della mucosa labiale aumentandone così il volume. Altre metodiche consistono essenzialmen-

di PIER LUIGI AMATA

te nell'innestare il proprio derma o il proprio grasso, oppure nell'impiantare nel labbro materiali come il Goretex che ne migliorano principalmente il contorno. Il limite di queste metodiche è che l'aumento di volume ottenibile è sempre moderato, pertanto non è indicato per quei pazienti che desiderano vistosi aumenti in altezza e proiezione delle labbra.

Preg. mo dott. Amata, sono una donna di 58 anni di età e le scrivo per avere qualche notizia sull'intervento estetico alle gambe. Mi sono

Labbra tumide senza silicone

già rivolta ad un medico il quale mi ha spiegato che la lipoaspirazione non era sufficiente perché c'era anche un problema di pelle caduta. Cosa si può fare in questi casi?

Il Lifting è l'intervento volto al miglioramento estetico delle cosce in pazienti con rilassamento e flaccidità della cute con o senza presenza di grasso in eccesso.

Il lifting di cosce consiste nell'asportare la pelle ed il grasso in eccesso (flaccidi), ripristinando il giusto tono cutaneo e ottenendo solo nei casi dove è necessario anche una riduzione della loro circonferenza.

Le cicatrici seguono la linea di piega delle cosce e sono poco percettibili, nei pazienti in cui sia stato necessario ridurre anche la circonferenza una cica-

trice verticale nell'interno cosce sarà anch'essa scarsamente identificabile.

L'intervento viene effettuato in anestesia generale con un ricovero di 24-48 ore e può essere associato, se necessario, all'intervento di lipoaspirazione di altre zone (es. addome, fianchi, interno ginocchia), il recupero funzionale è immediato, le ecchimosi e l'edema post-operatorio si risolvono in 20 giorni il risultato ottimale si può valutare dopo 6 mesi.

Mi sembra, infine, opportuno evidenziare che l'indicazione ad un lifting di cosce piuttosto che ad una lipoaspirazione o viceversa non è sempre così chiara, esistono infatti molte situazioni di confine in cui soltanto la stretta competenza specialistica può fornire le corrette valutazioni per la scelta dell'intervento.